

## AGARICUS BERNARDII

**Nom de référence** : *Agaricus bernardii* Quélet

**Synonymes** : *Agaricus maleolens* .F. H. Moller  
*Psalliota bernardii* (Quélet.) Quélet.

**Classification** : **Division** : Basidiomycota  
**Ordre** : Agaricales  
**Famille** : Agaricaceae

**Nom français** : agaric malodorant.

**Intérêt culinaire** : sans aucun intérêt culinaire.



Photo Wikimedia

## **1-DESCRIPTION**

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne, avec un chapeau surmontant un pied donnant au champignon la silhouette du champignon dit « de Paris ». Couleur dominante : brun clair à blanchâtre.
- 1-2 Chapeau** : de 5 à 15 cm, hémisphérique au début, devenant convexe à plan, il est mou en son centre. Le revêtement est sec, fissuré, craquelé, crevassé pour former des écailles gris-brunâtre clair sur un fond blanchâtre, cette couleur se teinte de brun-rougeâtre au grattage. La marge, plus pâle, épaisse, flexueuse, est enroulée et peut souvent être ornée des restes du voile.
- 1-3 Pied ou stipe** : 4-7 X 1-3,5 cm, cylindrique, aminci à pseudoradicant vers la base ou rarement un peu bulbeux, il est plein au début puis creux dans l'âge. Sa surface est sèche, revêtue de fines fibrilles longitudinales pâles au-dessus d'un anneau (loupe). Cet anneau est engainant, épais, ample, infère et délimite une zone supérieure de couleur blanche d'une zone inférieure un peu écailleuse et brun pâle à rosâtre. La face supérieure de cet anneau est prulineuse à squamuleuse (loupe).
- 1-4 Chair** : très épaisse, molle au centre du chapeau, de couleur blanche, elle vire au rosâtre après la coupe ou au grattage. Elle dégage une saveur douce mais peu agréable et une odeur désagréable.
- 1-5 Lames** : libres à l'insertion sur le pied, elles sont serrées et minces. La couleur des lames passe du rose saumon au brun-pourpre et enfin brun-noirâtre au fil du temps. Présence de lamelles et lamellules. L'arête est finement floconneuse de blanchâtre (loupe).
- 1-6 Sporée** : brun-noir.
- 1-7 Habitat** : dès le printemps et jusqu'en automne, il pousse dans les prairies humides, les prés salés. Il est plus fréquent le long des côtes marécageuses des régions méditerranéennes.
- 1-8 Répartition** : espèce assez rare.

## **2-OBSERVATIONS**

La synonymie (*Agaricus bernardii* = *Agaricus maleolens*) n'est pas admise par tous les mycologues.  
La description donnée dans cette fiche correspond plus particulièrement à *Agaricus bernardii*.

## **3-INTERÊT**

Aucun.

## **4-RISQUES DE CONFUSION**

Surtout avec *Agaricus bitorquis* en raison de son anneau engainant et sa chair rougissant après la coupe ou au frottement. *Agaricus maleolens* reste typique si on se réfère à sa chair moins compacte et surtout à son odeur de poisson.

**Vérfifié le 30 janvier 2014**