

## AMANITA ARGENTEA

**Nom de référence** : *Amanita argentea* (Huijsman)

**Synonymes** : *Amanita mairei* (Foley)  
*Amanita mairei* var. *argentea* (Huijsman) Bon & Contu

**Classification** : **Division** : Basidiomycota  
**Ordre** : Amanitales  
**Famille** : Amanitaceae

**Nom français** : amanite argentée.

**Intérêt culinaire** : comestible.



Photo Wikipedia

## **1-DESCRIPTION**

**1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : gris argenté.

**1-2 Chapeau** : 4 à 10cm pouvant atteindre 15 cm, il est subglobuleux au début puis convexe étalé et finalement aplati et même parfois déprimé. Le revêtement est lisse, luisant, gris cendré à gris argenté avec parfois des nuances ochracées, il peut être nu ou recouvert d'une seule et épaisse plaque membraneuse blanche provenant du voile général. La marge est striée à cannelée.

**1-3 Pied ou stipe** : 12-20 x 1-2,5 cm, il est élancé, cylindro-clavé mais non bulbeux, d'abord plein puis creux, il ne porte pas d'anneau. Sa surface est de couleur blanchâtre, entièrement chinée de crème grisâtre surtout à proximité de la base. Cette base est enfermée dans une volve en sac, blanche, épaisse, profondément enterrée, elle a tendance à jaunir à la manipulation.

**1-4 Chair** : elle est épaisse, blanche. Son odeur est nulle ou faible, sa saveur de noisette est parfois légèrement âcre.

**1-5 Lames** : libres à l'insertion sur le pied, assez serrées, elles sont blanches. Présence de lames et de lamellules. L'arête est aiguë, un peu floconneuse.

**1-6 Sporée** : blanche.

**1-7 Habitat** : isolée à grégaire, cette espèce vient de fin juin à octobre, dans les bois clairs de feuillus, endroits découverts, clairières. Elle vient surtout les années chaudes.

**1-8 Répartition** : champignon assez rare, il vient de la plaine à l'étage montagnard, plutôt sur sol calcaire.

## **2-OBSERVATIONS**

## **3-INTERÊT**

Comestible peu recommandable, elle doit être bien cuite.

## **4-RISQUES DE CONFUSION**

Peut être facilement confondue avec *Amanita vaginata*, cependant ces deux espèces sont bien différenciées par leurs caractères microscopiques.

**Vérfié le 19 juin 2014**