

## AMANITA PROXIMA

**Nom de référence** : *Amanita proxima* (Dumée)

**Synonymes** : aucun

**Classification** : **Division** : Basidiomycota

**Ordre** : Agaricales

**Famille** : Amanitaceae

**Nom français** : amanite à volve rousse.

**Intérêt culinaire** : toxique, **mortel**.



Photo : René Chalange

## **1-DESCRIPTION**

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : blanc à ivoire
- 1-2 Chapeau** : de 3 à 15 cm. Il est globuleux puis convexe, s'étalant avec l'âge. Le revêtement est brillant, lisse, de couleur « blanc de lait », il peut porter des flocons ochracés au centre qui sont des dépôts du voile général. La marge est blanche, excédante, appendiculée de restes ochracés du voile général, elle est non striée.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 4-20 x 1,5-3 cm. Il est cylindrique mais rétréci au sommet, clavé à presque bulbeux en bas. Il est blanc d'aspect lisse mais floconneux sous l'anneau. Il porte un anneau membraneux concolore au pied, peu crémeux et strié sur la face supérieure. La base du pied est contenue dans une volve engainante en sac, ample et haute, de couleur ocre avec des nuances d'orange et de roux.
- 1-4 Chair** : blanche, épaisse, assez ferme puis molle avec l'âge et devenant même cotonneuse. Son odeur de camembert ou d'iode est désagréable, sa saveur est douce.
- 1-5 Lames** : elles sont assez espacées, libres à l'insertion sur le pied, elles sont de couleur blanches mais se teintent de rose en vieillissant. Présence de lamelles et lamellules. L'arête est floconneuse.
- 1-6 Sporée** : blanche.
- 1-7 Habitat** : souvent sur sol calcaire et sablonneux, surtout sous les chênes, les hêtres et les pins en automne.
- 1-8 Répartition** : espèce thermophile, rare dans le nord de l'Europe, plus fréquente au sud.

## **2-OBSERVATIONS**

### **3-INTERÊT**

Espèce fortement toxique. Intoxication caractérisée par une atteinte rénale pouvant être fatale.

### **4-RISQUES DE CONFUSION**

Cette espèce peut être confondue avec l'*Amanita ovoidea* (comestible avec prudence). L'*Amanita proxima* s'en distingue par son port plus élancé, son anneau peu crémeux donc plus persistant et sa volve de couleur ochracée caractéristique dès son plus jeune âge.

**Vérfifié le 29 décembre 2012**