

## AURISCALPIUM VULGARE

**Nom de référence** : *Auriscalpium vulgare* S. F. Gray

**Synonymes** : *Pleurodon auriscalpium* (L.) Karsten  
*Scutigera auriscalpium* (L.) Paulet

**Classification** : **Division** : Basidiomycota  
**Ordre** : Russulales  
**Famille** : Auriscalpiaceae

**Nom français** : hydne cure-oreille.

**Intérêt culinaire** : aucun.



## **1-DESCRIPTION**

**1-1 Silhouette** : apparemment au sol, de petite dimension avec un pied latéral ou fortement excentré. Couleur dominante : brun puis brun-noirâtre.

**1-2 Chapeau** : de 1 à 2 cm de diamètre. Horizontal, il est semi-circulaire ou réniforme. Le revêtement est de couleur brun clair, puis devient noirâtre, il est hérissé de poils fins ou feutré jusqu'à la marge.

**1-3 Pied ou stipe** : de 8-12 cm x 1-2 mm. Il est brun-noirâtre. Latéral ou très excentré, il s'élève verticalement et est fixé à proximité de la marge du chapeau. Il est grêle, cassant, velu, feutré de poils concolores, il est épaissi à la base.

**1-4 Chair** : la chair du chapeau (et du pied) est fine, coriace, tenace, blanche. Elle devient roussâtre après la coupe. Sans odeur particulière, sa saveur est douce mais devient un peu âcre avec l'âge.

**1-5 Aiguillons** : l'hyménium est situé sous la face inférieure du chapeau. Il est constitué d'aiguillons clairs devenant brun-noirâtre avec l'âge. Ils sont assez espacés et coniques. Les aiguillons sont non décurrents et de longueur maximale 3 à 4 mm.

**1-6 Sporée** : blanche.

**1-7 Habitat** : essentiellement sur cônes de pins généralement semi-enfouis, on le rencontre toute l'année mais surtout en été et en automne.

**1-8 Répartition** : large.

## **2-OBSERVATIONS**

En raison de sa petite taille et de sa couleur l'hydne cure-oreille passe souvent inaperçu.

## **3-INTERÊT**

Aucun.

## **4-RISQUES DE CONFUSION**

Aucun.

**MAJ JM 20 juillet 2013**