

CANTHARELLUS CINEREUS

Nom de référence : *Cantharellus cinereus* (Pers.) Fr.

Synonymes : *Pseudocraterellus cinereus* (Pers.) Kalamees
Merulius cinereus Pers.

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Cantharellales
Famille : Cantharellaceae

Nom français : chanterelle cendrée.

Intérêt culinaire : bon comestible.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, rarement seul, de dimension faible à moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau se creusant avec l'âge. Couleur dominante : gris-noirâtre.
- 1-2 Chapeau** : de 2 à 5 cm, il est convexe puis ombiliqué et évasé en pavillon de trompette. Le revêtement est gris-noir ou gris-cendré, pâlisant par temps sec. Il apparaît feutré à pelucheux, réticulé de veinules radiales à peine saillantes, squamuleux plus près de la marge (loupe). Il est souvent percé d'un trou en son centre. La marge est très mince, incurvée, ondulée, lobée, plus claire que l'ensemble du chapeau
- 1-3 Pied ou stipe** : 2-8 x 0,2-0-4 cm, il est grêle, atténué de haut en bas, souvent plein, il peut cependant être creux. Il est de même couleur que le chapeau mais plus noir à la base. Sa surface est fibrilleuse à triée (loupe).
- 1-4 Chair** : de couleur noirâtre, elle est mince, membraneuse, saine, à odeur fruitée agréable et de saveur douce.
- 1-5 Lames, plis** : cette espèce n'a pas de vraies lames mais des plis lamelliformes. Ces plis sont décourants, espacés, obtus sur l'arête, ramifiés, interveinés, gris-bleuâtre, puis recouvert d'une pruine farineuse blanche.
- 1-6 Sporée** : blanchâtre.
- 1-7 Habitat** : assez rare, on trouve cette chanterelle dans les bois de feuillus (hêtres surtout) en plaine mais aussi en montagne. Elle préfère les sols calcaires. Elle vient parfois parmi les trompettes des morts.
- 1-8 Répartition** : grégaire, du printemps à l'automne.

2-OBSERVATIONS

La chanterelle cendrée se dessèche très facilement.

3-INTERÊT

Bon comestible.

4-RISQUES DE CONFUSION

Le risque existe surtout avec la trompette des morts (*Craterellus cornucopioides*). Pour reconnaître à coup sur ces deux espèces, il suffit d'examiner la face inférieure du chapeau : elle est grossièrement lisse chez la trompette, elle est marquée de plis distincts chez la chanterelle cendrée.

MAJ MJ 20 juillet 2013