

CORTINARIUS ORELLANUS

Nom de référence : *Cortinarius orellanus* (Fr.) Fries

Synonymes : *Dermocybe orellana* (Fr.) Ricken

Classification : **Division** : Basidiomycota

Ordre : Agaricales

Famille : Cortinariaceae

Nom français : cortinaire couleur de rocou, cortinaire des montagnes, cortinaire brillant.

Intérêt culinaire : **mortel**.



Photo : René Chalange

1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau campanulé puis étalé. Couleur dominante : roux-orangé à brun-roux.
- 1-2 Chapeau** : de 3 à 8 cm, conique à campanulé puis aplani mais restant peu (ou pas) mamelonné, il est de couleur brun-orangé à brun-roux. Le revêtement est mat, feutré à velouté avec un aspect fibrilleux (loupe). La marge est étroite, incurvée au début puis droite et enfin sinueuse.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 6-10 x 0,8-1,2 cm, il est cylindrique mais aminci-courbé à la base. Sa surface est de couleur jaune-citrin dans la jeunesse mais devient rapidement concolore au revêtement du chapeau. Elle est rayée longitudinalement et marquée de discrètes chinures/zébrures superposées de couleur jaunâtre, ce sont les traces de la cortine, elles disparaissent rapidement.
- 1-4 Chair** : plutôt mince et ferme, elle est jaune-roussâtre clair mais sensiblement plus foncée sous le revêtement. Elle exhale une odeur de rave, sa saveur est un peu acidulée.
- 1-5 Lames** : les lames sont adnées à l'insertion sur le pied, elles sont épaisses et nettement espacées, de couleur jaune-orangé à brun-roux vif. Présence de lamelles et lamellules. L'arête est un peu denticulée et de couleur plus pâle que les faces.
- 1-6 Sporée** : rouille, comme tous les cortinaires.
- 1-7 Habitat** : sous feuillus, rarement sous conifères. De préférence sous bouleaux, chênes, châtaigniers, hêtres.
- 1-8 Répartition** : espèce assez peu commune, avec une préférence pour la moyenne montagne.

2-OBSERVATIONS

La toxicité de beaucoup de cortinaires se situe entre « toxique » et « mortelle ». Cette espèce est mortelle, l'incubation est très longue, de plusieurs jours à deux semaines, ce qui rend le diagnostic délicat et les traitements difficiles (dégénérescence du foie et lésions rénales déjà très avancées). L'appellation française « cortinaire des montagnes » se rencontre dans les ouvrages anciens. Elle est erronée et due à une erreur de traduction.

3-INTERÊT

Champignon mortel, espèce à connaître et à reconnaître. On ne consommera aucun cortinaire de couleur roux-orangé.

4-RISQUES DE CONFUSION

Avec *Cortinarius rubellus* dont le chapeau est mamelonné, et qui est aussi une espèce mortelle.

Vérifié le