

## GEOPORA SUMNERIANA

**Nom de référence** : *Geopora sumneriana* (Cooke) M. Torre

**Synonymes** : *Sepultaria sumneriana* (Cooke) Massee

*Peziza sumneriana* Cooke

**Classification** : **Division** : Ascomycota

**Ordre** : Pezizales

**Famille** : Pyronemataceae

**Nom français** : géopore des cèdres, pézize des cèdres, géopore de Sumner

**Intérêt culinaire** : aucun.



## **1-DESCRIPTION**

**1-1 Silhouette** : au sol, de dimension faible à moyenne, ce champignon, profondément enfoui, est en forme de coupelle ou de vase aux bords irréguliers. Couleur dominante : brun-jaunâtre.

**1-2 Chapeau ou réceptacle** : de 2 à 8 cm de diamètre. Les mycologues nomment ce réceptacle apothécie, il est en forme de petites sphères éclatées, un peu enfouies puis à ras de terre, l'intérieur est gris clair à jaunâtre, il est lisse et présente des ondulations, la face extérieure est brune, feutrée de longs poils souples. La marge est déchirée, lobée.

**1-3 Pied ou stipe** : absent.

**1-4 Chair** : elle est épaisse, blanchâtre et cassante. L'odeur et la saveur sont peu marquées.

**1-5 Lames, tubes et pores, aiguillons** : néant. L'hyménium se situe sur la face interne de la coupe.

**1-6 Sporée** : blanche.

**1-7 Habitat** : surtout sous les cèdres, plus rarement sous les thuyas ou les ifs. Au printemps, il est très fidèle à ses stations d'une année sur l'autre. Plusieurs exemplaires sont souvent serrés les uns contre les autres.

**1-8 Répartition** : assez commune.

## **2-OBSERVATIONS**

Aucune.

## **3-INTERÊT**

Aucun.

## **4-RISQUES DE CONFUSION**

Facile à reconnaître par son habitat particulier et sa venue au printemps.

1. ***Vérifié 22 novembre 2012***
2. ***MAJ MJ 22 juillet 2013***
3. ***Modification photographie le 29/10/2019***