

HYPOXYLON FRAGIFORME

Nom de référence : *Hypoxylon fragiforme* (Scopoli) Kickx

Synonymes : *Hypoxylon coccineum* Bulliard
Hypoxylon argillaceum (Fr.) Kickx

Classification : **Division:** Ascomycota
Ordre : Xylariales
Famille : Xylariacea

Nom français : hypoxylon en forme de fraise.

Intérêt culinaire : non comestible.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : en groupes sur bois, de faible dimension, il a la forme d'une petite masse globuleuse et rugueuse. Couleur dominante : d'abord rouge-brique, puis noire.

1-2 Fructification : ce champignon, vaguement sphérique, mesure de 0,4 à 1 cm de diamètre. Il ne possède ni chapeau ni pied. La partie visible du champignon prend le nom générique de fructification, de carpophore, de sporophore, de sporome... La fructification est une masse globuleuse dure dont la surface est rendue rugueuse et bosselée par les orifices proéminents (ou ostioles) placés au sommet de minuscules articles superficiels (périhèces). L'ensemble ressemble à une petite fraise. La couleur d'abord brun-rouge vire progressivement au brun-noir avec l'âge.

1-3 Pied ou stipe : inexistant.

1-4 Chair : une coupe transversale fait apparaître une matière brun-noirâtre, ferme, coriace.

1-5 Lames, tubes et pores, aiguillons : inexistants.

1-6 Sporée : noire.

1-7 Habitat : en groupes denses sur (ou dans) l'écorce des branches mortes de hêtres essentiellement. Toute l'année.

1-8 Répartition : champignon très fréquent partout en France.

2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT

Aucun.

4-RISQUES DE CONFUSION

Des risques de confusion existent avec *Hypoxylon multiforme*, *Hypoxylon fuscum*, *Hypoxylon howianum* et quelques voisins, tous démunis d'intérêt.

Vérifié en séance

MAJ MJ 22 juillet 2012