

## LACTARIUS UVIDUS

**Nom de référence** : *Lactarius uvidus* (Fr.) Fr.

**Synonymes** : *Agaricus uvidus* Fr.

*Galorrheus uvidus* (Fr.) P. Kumm.

**Classification** : **Division** : Basidiomycota

**Ordre** : Russulales

**Famille** : Russulaceae

**Nom français** : lactaire humide.

**Intérêt culinaire** : non comestible.



## **1-DESCRIPTION**

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau aplati à déprimé. Couleur dominante : gris- lilas à beige-roussâtre.
- 1-2 Chapeau** : de 3-10 cm. Il est convexe au début, parfois mamelonné, puis étalé et enfin légèrement déprimé. Le revêtement est séparable jusqu'à mi-rayon, il est très visqueux, brillant, glabre, de couleur immuable, uniformément beige clair, se teintant de gris-rosâtre-lilacin, il est généralement non zoné. La marge est concolore au revêtement, elle est unie, enroulée, régulière ou lobée.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 4-10 X 1-3 cm. Il est humide, visqueux, de forme cylindrique ou épaissi en bas, fragile, spongieux, farci d'une moelle, creux à la fin. Sa surface est de couleur blanc-crème sauf tout en bas où elle est nettement brun-jaunâtre, elle peut se marquer de petites fossettes allongées (loupe), elle est légèrement rugueuse et se tache de brun-violet aux blessures.
- 1-4 Chair** : épaisse de 5 mm dans le chapeau, elle est assez fragile, molle, blanche, jaunâtre à la base du pied, gris-lilacin sous le revêtement du chapeau. Après la coupe la chair vire au violet en 15 minutes environ. Le lait blanc, devient vite violet à l'air. La saveur est douce puis âcre à amère, l'odeur est faible, un peu fruitée.
- 1-5 Lames** : adnées à subdécurrentes à l'insertion sur le pied, assez serrées, fourchues près du pied, elles sont larges, atténuées aux deux extrémités. Elles sont de couleur crème avec des nuances carnées, le lait les tache localement de lilas terne. Présence de nombreuses lamelles et lamellules. L'arête est aiguë, entière, d'abord concolore aux faces des lames puis brunissant plus tard.
- 1-6 Sporée** : crème-blanchâtre à peine carnée.
- 1-7 Habitat** : en été et automne, dans les bois de feuillus et de résineux, surtout sur sols acides. On le trouve aussi dans les tourbières.
- 1-8 Répartition** : assez peu courant en plaine et en montagne.

## **2-OBSERVATIONS**

Dans son ouvrage « *LACTARIUS* Pers. » Maria-Teresa Basso décrit onze variétés ou formes de *Lactarius uvidus*.

## **3-INTERÊT**

Non comestible.

## **4-RISQUES DE CONFUSION**

Avec les autres espèces à lait devenant violet dont : *Lactarius repraesentaneus*, *Lactarius violascens*, *Lactarius flavidus*,...

Sans lait violet : *Lactarius albocarneus* et *Lactarius trivalis*.

**Vérfié le 18 avril 2013**

**MAJ MJ le 6 août 2013**