

LENTINUS TIGRINUS

Nom de référence : *Lentinus tigrinus*(Bull.) Fr.

Synonymes : *Panus tigrinus* (Bull.) Fr.
Pleurotus tigrinus (Bull.) Kühner

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Polyporales
Famille : Polyporaceae

Nom français : lentin tigré.

Intérêt culinaire : médiocre comestible jeune.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : en touffe sur bois dans des lieux humides, de dimension moyenne, avec un pied surmonté d'un chapeau plat. Couleur dominante : blanc, couvert d'écailles foncées.
- 1-2 Chapeau** : 2 à 8 cm. Plat à l'état jeune puis vite creusé en forme d'entonnoir chez les adultes. Le revêtement est blanchâtre, il est couvert d'écailles gris noirâtre denses autour de la zone discale. La marge est aiguë, régulière et blanche.
- 1-3 Pied ou stipe** : 1-5 x 0,2-0,5 cm, cylindrique, il est central mais plus souvent excentré. En surface il est crème ou jaunâtre et couvert de petites mèches brun-gris et porte dans sa jeunesse une membrane annulaire rudimentaire.
- 1-4 Chair** : mince et tenace, fibreuse, blanche. Son odeur est fruitée à fongique, parfois de beurre, sa saveur est douce.
- 1-5 Lames** : fortement décurrentes, elles sont de couleur crème à jaune ochracé. L'arête est fortement dentelée.
- 1-6 Sporée** : crème-ochracé.
- 1-7 Habitat** : en été et en automne sur troncs et souches de saules et de peupliers principalement.
- 1-8 Répartition** : ce champignon est un habitant traditionnel des lieux humides tant en plaine qu'en montagne.

2-OBSERVATIONS

En automne il n'est pas rare de le rencontrer, mais il faut parfois pénétrer dans l'eau pour le cueillir.

3-INTERÊT

Médiocre comestible très jeune, immangeable plus tard.

4-RISQUES DE CONFUSION

Avec le lentin écailleux (*Neolentinus lepideus*) qui est plus gros et vient sur bois mort de conifères.

Vérfifié le 6 juin 2013