

MYCENA ERUBESCENS

Nom de référence : *Mycena erubescens* von Höhnel

Synonymes : *Mycena fellea* J. E. Lange
Mycena parabolica Fr.

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Agaricales
Famille : Marasmiaceae

Nom français : mycène amère, mycène à chair amère.

Intérêt culinaire : non comestible.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : sur écorce, de faible dimension avec un pied central surmonté d'un chapeau campanulé-conique. Couleur dominante : ocre-brun.

1-2 Chapeau : de 0,4 à 1,5 cm. Il est hémisphérique, conique puis campanulé-conique. Le revêtement est lisse, mat, soyeux, brillant, un peu lubrifié par temps humide. Il est strié par transparence presque jusqu'au centre. Le centre est marqué par une petite papille plus sombre. En surface il est pruineux de blanc dans la jeunesse, sinon il est gris-brunâtre, brun-rougeâtre, souvent teinté de rose. La marge est striée, aiguë, plus pâle que le revêtement.

1-3 Pied ou stipe : de 1,5-7 x 0,05-0,15 cm. Cylindrique, vite creux, cassant, il est souvent arqué-coudé. Sa surface est lisse, plus ou moins soyeuse, elle est de couleur gris-brunâtre sauf près du sommet où elle est pâle. La base est finement strigieuse de poils blancs. A la cassure le pied exsude un lait incolore ou un peu blanchâtre, ce lait n'est visible que sur les exemplaires frais, de plus il est vite tari.

1-4 Chair : très mince, aqueuse, elle est gris-brunâtre. Sa saveur est très amère alors que son odeur est nulle ou faible. La chair du pied exsude un lait incolore à la cassure lorsque le champignon est frais.

1-5 Lames : elles sont assez peu serrées, larges, adnées, ascendantes. Elles sont blanches avec des reflets roses puis elles virent au gris. Présence de lamelles et de lamellules. L'arête est lisse, entière et reste blanche.

1-6 Sporée : blanche.

1-7 Habitat : sur écorce moussue de feuillus vivants ou morts (frênes, chênes, etc.), très rare sur résineux. Cette mycène vient isolément ou en groupes plus ou moins denses, en été et en automne. On peut la trouver à plusieurs mètres de hauteur.

1-8 Répartition : espèce peu fréquente en plaine et en montagne.

2-OBSERVATIONS

Il faut être attentif et procéder avec délicatesse pour voir le lait suinter à la coupure du pied des jeunes exemplaires.

3-INTERÊT

La mycène amère n'est pas comestible.

4-RISQUES DE CONFUSION

Aucun pour qui est attentif à l'habitat, au goût et à la présence de lait à la cassure du pied des exemplaires jeunes et frais.

Vérifié le 17 janvier 2013

MAJ MJ le 1er juillet 2013