

## MYCENA HAEMATOPUS

**Nom de référence :** *Mycena haematopus* (Pers.) Kummer

**Synonymes :** *Mycena haematopoda* (Pers.) Kummer  
*Galactopus haematopus* (Pers.) Earle

**Classification :** **Division :** Basidiomycota

**Ordre :** Agaricales

**Famille :** Mycenaceae

**Nom français :** mycène à lait rouge.



## **1-DESCRIPTION**

**1-1 Silhouette** : sur bois, de faible dimension avec un pied central surmonté d'un chapeau campanulé-conique. Couleur dominante : rose-brunâtre.

**1-2 Chapeau** : de 0,5 à 3 cm. Il est hémisphérique puis campanulé-conique. Le revêtement est mat, pruineux (loupe) dans la jeunesse, glabre ensuite, soyeux et brillant, il est de couleur rose-brun, brun-carné, plus foncé au centre. La marge est appendiculée, denticulée par transparence, elle est striée jusqu'à mi-rayon, sa couleur est crème-rosé pâle.

**1-3 Pied ou stipe** : de 2-8 x 0,1-0,3 cm. Cylindrique, cassant, il est vite creux, sa base peut présenter des traces rougeâtres de mycélium. Sa surface est lisse, soyeuse, mate, concolore au chapeau, plus foncée en bas, elle est ponctuée de pruine (loupe). Le bas du pied est feutré.

**1-4 Chair** : mince, aqueuse, de couleur brun-ochracé dans le chapeau, plus foncée dans le pied. Sa saveur et son odeur de radis sont faibles. Chez les champignons jeunes et frais un lait brun-rouge apparaît à la coupe du chapeau et du pied.

**1-5 Lames** : elles sont assez serrées, adnées à ascendantes avec une petite dent de décurrence à la jonction avec le pied. Présence de lamelles et de lamellules. Les lames sont crème-rose pâle au début, elles se tachent de brun-rouge au frottement et dans les blessures. L'arête est lisse, entière, concolore au revêtement du chapeau au début, rougeâtre plus tard.

**1-6 Sporée** : blanche.

**1-7 Habitat** : sur souches, branches mortes de feuillus, rare sur bois de conifères. Cette mycène vient parfois isolément mais plus généralement en touffe, du printemps jusqu'en automne.

**1-8 Répartition** : espèce assez fréquente en plaine et en montagne.

## **2-OBSERVATIONS :**

Il faut être attentif et procéder avec délicatesse pour voir le lait brun-rouge suinter à la coupure du chapeau ou du pied.

## **3-INTERÊT :**

La mycène à lait rouge n'est pas comestible.

## **4-RISQUES DE CONFUSION :**

Les autres mycènes à lait plus ou moins rouge : *Mycena sanguinolenta*, *Mycen crocata*, etc. Elles sont toutes sans valeur culinaire.

**MAJ MJ le 2 août 2013**