

## PAXILLUS IONIPUS

**Nom de référence** : *Paxillus ionipus* (Quél.)

**Synonymes** : *Paxillus panuoides* var *ionipus* (Quél.) Tkalcec & Mesic  
*Tapinella panuoides* var. *ionipus* (Quél.) C. Hahn

**Classification** : **Division** : Basidiomycota  
**Ordre** : Boletales  
**Famille** : Paxillaceae

**Nom français** : paxille faux panus.

**Intérêt culinaire** : toxique.



Photo : Michel Javayon

## **1-DESCRIPTION**

- 1-1 Silhouette** : sur bois de conifères, de petite dimension avec un chapeau en forme de spatule, pied absent ou rudimentaire et latéral. Couleur dominante : brun ochracé, de forme très variable, spatulée.
- 1-2 Chapeau** : 3- 10 cm de long, 3-5 cm de large, il est en forme de spatule un peu bombée. Le revêtement est sec, feutré, hérissé de poils bruns vers la base, il est de couleur brun ochracé à crème ochracé. La marge est mince, sinueuse, puis découpée en lobes imbriqués.
- 1-3 Pied ou stipe** : souvent réduit mais existant, il est décentré ou latéral, selon le substrat, prolongé il est parfois par des filaments mycéliens. En surface il porte un feutrage violet plus ou moins envahissant.
- 1-4 Chair** : assez épaisse au centre du chapeau, mince à proximité de la marge, elle est molle et un peu cotonneuse, elle est blanche à crème ou même lavée de jaune. Odeur agréable, saveur douce,
- 1-5 Lames** : décurrentes à l'insertion sur l'embryon de pied, elles sont assez serrées, fourchues à proximité de la marge du chapeau, crispées ou ondulées, interveinées ou même anastomosées à alvéolées à proximité du pied, elles sont de consistance molle et séparables de la chair du chapeau avec l'ongle. Présence de lamelles et de lamellules. L'arête est flexueuse, aiguë et entière.
- 1-6 Sporée** : rouille ochracé.
- 1-7 Habitat** : en touffe ou groupe serré avec les chapeaux imbriqués, surtout sur bois de conifères, parfois en absence totale de lumière (caves, mines) en automne et en hiver. Espèce peu fréquente.

## **2-OBSERVATIONS**

### **3-INTERÊT**

Non comestible.

### **4-RISQUES DE CONFUSION**

Cette espèce peut être confondue avec *Paxillus panuoides* dont le pied n'est pas teinté de violet ou encore avec *Phyllotopsis nidulans*, à chair tenace, à lames ne se détachant pas facilement de la chair du chapeau et à sporée rosâtre.

*Vérfifié en séance*