

PLUTEUS LEONINUS

Nom de référence : *Pluteus leoninus* (Schaeffer) Kummer

Synonymes : *Pluteus fayodii* Damblon, Darimont et Lambinon
Pluteus flavobrunneus J. Fabre

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Pluteales
Famille : Pluteaceae

Nom français : plutée couleur de lion.

Intérêt culinaire : non comestible.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : sur bois, de faibles dimensions avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : jaune lumineux.

1-2 Chapeau : de 2 à 6 cm. Peu charnu, hémisphérique-campanulé puis convexe à aplani, il conserve un mamelon peu marqué. Le revêtement est lisse, mat et finement feutré (loupe), il est de couleur jaune mais le disque central est souvent jaune-brun et généralement un peu méchuleux. Parfois des veines jaune-brun émanent du disque central. Par temps sec la couleur est plus pâle que par temps humide (hygrophanéité). La marge est fine et plus pâle, elle est courtement striée par temps humide, les stries sont moins nettes par temps sec.

1-3 Pied ou stipe : de 4-8 x 0,2-0,5 cm. Il est cylindrique, plein lorsque le champignon est jeune puis creux, élastique. Sa surface est blanchâtre, jaune pâle et teintée d'olivâtre vers la base, elle est fibrilleuse (loupe) et même striée en bas. Le pied est plein mais il devient fistuleux avec l'âge.

1-4 Chair : elle est peu épaisse, blanche mais teintée de jaune sous la cuticule. L'odeur est un peu raphanoïde, la saveur est douce et assez fade.

1-5 Lames : relativement larges et serrées, elles sont ascendantes, libres, ou à peine adnées au niveau du pied. Lorsque le champignon est jeune elles sont blanches et souvent teintées de jaune à proximité de la marge du chapeau, puis elles jaunissent plus nettement et virent finalement roses. Des lamelles et lamellules sont présentes mais peu nombreuses. L'arête des lames est finement floconneuse et présente un fin liseré jaune (loupe).

1-6 Sporée : rose à brique.

1-7 Habitat : sur bois morts de feuillus et de résineux, troncs, branches, débris ligneux, copeaux en été et en automne. *Pluteus leoninus* peut sembler pousser au sol, en fait, il est alors greffé sur du bois enfoui.

1-8 Répartition : espèce occasionnelle en plaine et en montagne. Elle vient isolément, plus rarement en petit groupe.

2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT

Non comestible.

4-RISQUES DE CONFUSION

Principalement avec *Pluteus chrysophaeus*.

Vérfié le 2 mai 2013