

POLYPORUS CILIATUS

Nom de référence : *Polyporus ciliatus* Fr.

Synonymes : *Polyporellus ciliatus* (Fr.) P. Karst.
Leucoporus ciliatus (Fr.) Quél.

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Polyporales
Famille : Polyporaceae

Nom français : polypore cilié.

Intérêt culinaire : aucun.



Photo : Patrice Canal

1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : sur bois mort, généralement de dimension assez faible avec un pied central surmonté d'un chapeau squamuleux. Couleur dominante : brun sur fond beige
- 1-2 Chapeau** : de 3 à 7 cm de diamètre, il est mince, circulaire, convexe à aplati puis déprimé sur le tard. Jeune, il est revêtu des petites squames brunes sur un fond beige qui s'estompent avec l'âge. La marge est fine, enroulée et porte des cils ou petites fibres foncés (loupe) plus facilement visibles sur les jeunes exemplaires.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 2-6 x 0,3-0,8 cm, cylindrique, central ou un peu excentré, il est souvent courbé et élargi à la base. Sa surface est cernée de chinures/zébrures brunes sur un fond plus pâle.
- 1-4 Chair** : elle est blanche, tenace, mince coriace et élastique. L'odeur et la saveur sont nulles ou faibles.
- 1-5 Tubes et pores** : ils sont blancs à crème. Les tubes sont courts et brièvement décurrents à l'insertion sur le pied. Les pores sont circulaires, très petits (5 à 7 par mm) donc difficilement visibles à l'œil nu (loupe). Les tubes ne sont pas séparables de la chair du chapeau.
- 1-6 Sporée** : blanche.
- 1-7 Habitat** : sur bois mort de feuillus surtout au printemps, il est très rare sur résineux. Ce champignon vient isolé ou en groupe non serré.
- 1-8 Répartition** : commun partout.

2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT

Aucun.

4-RISQUES DE CONFUSION

Surtout avec *Polyporus brumalis* (à pores plus gros, pied non chiné et marge du chapeau non ciliée), et à moindre degré avec *Polyporus durus*, *Polyporus varius*, *Polyporus arcularius*.

Vérfifié le 29 septembre 2013