

## PSATHYRELLA SPADICEOGRISEA

**Nom de référence** : *Psathyrella spadiceogrisea* (Schaeff.) Maire

**Synonymes** : *Drosophila spadiceogrisea* (Schaeff.) Quél.  
*Psilocybe spadiceogrisea* (Schaeff.) Boudier

**Classification** : **Division** : Basidiomycota  
**Ordre** : Agaricales  
**Famille** : Psathyrellaceae

**Nom français** : psathyrelle grisâtre.

**Intérêt culinaire** : toxique.



Photo : Claude Tinlot



## **1-DESCRIPTION**

**1-1 Silhouette** : au sol, de dimension faible à moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : fauve-ochracé.

**1-2 Chapeau** : de 2 à 6/7 cm. Il est ovoïde-campanulé au début, puis il prend vite une forme convexe/aplatie et mamelonnée. Le revêtement est de couleur variable dans le temps et en fonction de l'humidité, il est lisse et à peine lubrifié ou alors légèrement rugueux, peu ou pas marqué par les restes du voile, il est hygrophane. Il présente une couleur brun ochracé ou brun-grisâtre par l'humidité, en séchant le revêtement devient ocre pâle à beige à partir du centre du chapeau. La marge est plus ou moins longuement striée, elle porte dans la jeunesse des restes du voile.

**1-3 Pied ou stipe** : 4-8 x 0,5-0,8 cm, il est central, cylindrique, cassant et creux. Sa surface est blanche, lustrée-satinée, blanc crème, lisse, à peine fibrilleuse mais un peu pruineuse en haut (loupe). Sa base est épaissie et un peu feutrée de blanchâtre.

**1-4 Chair** : peu épaisse, elle est brun clair à ocre crème et immuable. Elle offre une odeur faible et une saveur fade mais faible.

**1-5 Lames** : ascendantes à adnées, rarement avec un filet subdécurrent à l'insertion sur le pied, elles sont assez serrées et minces. De couleur crème sur les jeunes champignons, elles deviennent brun-gris pâle puis brun chocolat et sont toujours plus ou moins lavées de lilas. Lamelles et lamellules présentes. L'arête est plus pâle que les faces des lames, elle porte de fins cils dans la jeunesse (forte loupe).

**1-6 Sporée** : noire.

**1-7 Habitat** : isolée, groupée mais jamais en touffe, cette espèce vient dans les forêts de feuillus et de conifères. On la trouve au sol, sur les débris végétaux dès le printemps jusqu'en automne.

**1-8 Répartition** : espèce fréquente en plaine et en montagne.

## **2-OBSERVATIONS**

Les scientifiques ont créé des variétés qui se distinguent du type par des nuances de couleurs ou d'habitat.

## **3-INTERÊT**

Cette espèce et ses sosies sont toxiques.

## **4-RISQUES DE CONFUSION**

Avec toutes les psathyrelles brunes ne poussant pas en touffe.

**Vérifié le 5 juillet 2013**