

PYCNOPORUS CINNABARINUS

Nom de référence : *Pycnoporus cinnabarius* (Jacq.) P. Karst.

Synonymes : *Phellinus cinnabarinus* (Jacq.) Quél.
Trametes cinnabarina (Jacq.) Fr.

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Polyporales
Famille : Polyporaceae

Nom français : polypore cinabre.

Intérêt culinaire : à rejeter.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : sur bois, de dimension faible à moyenne en forme de console ou d'éventail. Couleur dominante : rouge orangé vif.

1-2 Chapeau ou réceptacle : de 3 à 10 cm en longueur pour une épaisseur de 0,5 à 2 cm, il est à demi-résupiné, bosselé, en forme d'éventail presque circulaire plus ou moins convexe ou assez plat. Son revêtement est duveteux lorsque le champignon est jeune, plus tard il est lisse et un peu ridé, il est de couleur cinabre (rouge orangé vif) ternissant plus tard. Les zones d'accroissement sont plus orange-rouge et veloutées. La marge est aiguë et concolore au revêtement. La marge est épaisse.

1-3 Pied ou stipe : inexistant, le chapeau est largement fixé sur le bois.

1-4 Chair : appelée (trame), elle est relativement épaisse et subéreuse (de la consistance du liège), molle, spongieuse. Elle est de couleur jaune-orangé pâle zonée de blanchâtre. L'odeur et la saveur sont nulles.

1-5 Tubes et pores : les tubes mesurent de 2 à 5 mm de long, ils sont non stratifiés et plus colorés que la trame. Les pores sont assez petits (2 à 3 par mm), arrondis ou anguleux, fimbriés, et de couleur rouge-cinabre. Ils couvrent toute la surface de l'hyménium.

1-6 Sporée : blanchâtre.

1-7 Habitat : sur bois mort, souches, troncs, branches de feuillus. Il forme de petites guirlandes colorées plus ou moins étendues.

1-8 Répartition : cette espèce pousse de l'été à l'automne, elle est assez commune mais semble absente dans le nord et l'ouest de la France.

2-OBSERVATIONS

Il s'agit d'un champignon saprophyte, il provoque une pourriture blanche ou orangée.

C'est la seule espèce du genre *Pycnoporus* venant en Europe.

3-INTERÊT

Non comestible.

4-RISQUES DE CONFUSION

Peut être confondu avec *Hapalopiluss croceus*, *Pycnoporellus fulgens*.

Vérfifié en séance