

RUSSULA ATROPURPUREA

Nom de référence : *Russula atropurpurea* (Krombh.) Britzel.

Synonymes : *Russula krombholzii* Schaffer
Russula fragilis var. *atropurpurea* Singer

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Russulales
Famille : Russulaceae

Nom français : russule pourpre et noire.

Intérêt culinaire : non comestible.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe puis étalé mais peu déprimé. Couleur dominante : rouge-pourpre.
- 1-2 Chapeau** : de 5 à 12 cm. Hémisphérique puis convexe, il s'aplanit ensuite et finit par être étalé mais peu déprimé. Le revêtement est lisse, brillant, légèrement lubrifié, séparable de la chair du chapeau sur 1/2 à 1/3 du rayon. Il est rouge-pourpre vers l'extérieur mais noirâtre au centre. Le centre se tache de macules brunâtres (loupe). Le revêtement est parfois assez nettement teinté de violet. La marge est mince, unie, enroulée ou incurvée, lisse et plus ou moins flexueuse et sensiblement concolore au reste du revêtement du chapeau (hors disque central).
- 1-3 Pied ou stipe** : de 2-6 x 1-2,5 cm, il est central, robuste, cylindrique souvent évasé tout en haut ; il est plein puis vermoulu et finalement creux. Sa surface est de couleur blanche mais elle tend à grisonner un peu et à se tacher de brun-jaunâtre tout en bas. Le sommet est pruineux, sinon la surface est très légèrement rugueuse (loupe).
- 1-4 Chair** : assez épaisse, ferme, elle est blanche, à peine grisonnante plus tard. L'odeur est faible et la saveur un peu âcre surtout dans les lames.
- 1-5 Lames** : adnées à l'insertion sur le pied, elles sont assez serrées, friables et de couleur blanche à peine teintée de crème. Quelques lames sont fourchues près du pied. Les lamelles et lamellules sont absentes ou rares. L'arête est aiguë, entière et concolore à la face des lames
- 1-6 Sporée** : blanc pur.
- 1-7 Habitat** : dans les bois, sous feuillus et résineux. Du début de l'été jusqu'à la fin de l'automne sur sol neutre ou acide.
- 1-8 Répartition** : espèce fréquente aussi bien en plaine qu'en montagne où elle vient isolément ou en petits groupes.

2-OBSERVATIONS

Cette russule a longtemps été nommée *Russula krombholzii* en l'honneur de M. Krombholz, grand mycologue. Pour des raisons d'antériorité nomenclaturales elle est maintenant sanctionnée sous le nom de *Russula atropurpurea*, ce qui offre aussi l'avantage d'être plus significatif.

Les russules sont généralement séparées en deux groupes : les « douces » et les « âcres », pour les reconnaître il suffit de mâcher un petit morceau du chapeau puis de le recracher.

La chair des russules étant granuleuse, leur pied casse comme un bâton de craie, il est donc impossible de tirer des lanières de la chair ou du cortex du pied.

3-INTERÊT

Non comestible.

4-RISQUES DE CONFUSION

Les risques de confusion sont assez nombreux avec d'autres russules pourpres, âcres, à lames blanchâtres.

Vérifié le 16 janvier 2014