

## RUSSULA CHLOROIDES

**Nom de référence** : *Russula chloroides* (Krombholz) Bresadola

**Synonymes** : *Russula delicula* Romagnesi

*Russula delica* var. *chloroides* (Krombholz) Killerman

**Classification** **Division** : Basidiomycota

**Ordre** : Russulales

**Famille** : Russulaceae

**Nom français** : russule à lames glauques, russule à lames étroites, russule verdâtre.

**Intérêt culinaire** : aucun.



## **1-DESCRIPTION**

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne à grande avec un pied central surmonté d'un chapeau profondément creusé. Couleur dominante : blanc.
- 1-2 Chapeau** : de 4 à 12 cm. Il est convexe puis très nettement creusé en entonnoir qui forme un V dont le fond est étroit. Le revêtement est peu séparable, il est blanc puis crème, jaunissant plus tard. Sec, sauf par temps humide, il est prumineux ou velouté (loupe) dans la jeunesse et enfin glabre. La marge est fine, enroulée, flexueuse, excédante.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 3-7 x 1-3 cm. Il est central, cylindrique, égal, plein, pouvant devenir creux ou caverneux. Sa surface blanche, un peu jaunissante, sèche, elle est prineuse. En haut du pied la surface présente souvent une zone bleu-vert pâle formant un cerne juste sous les lames, mais zone est parfois subtile, peu facile à voir et parfois même absente.
- 1-4 Chair** : épaisse, ferme, cassante, blanche à crème lors de la coupe, elle se teinte un peu de brun-jaune après la coupe. Sa saveur est douce, sauf dans les lames où elle âcre et piquante, l'odeur est fruitée.
- 1-5 Lames** : peu larges comparativement à l'épaisseur de la chair, très serrées, arquées, elles sont largement adnées à subdécurrentes. De couleur blanche, elles présentent souvent un reflet bleu-vert discret mais encore plus visible à proximité, avec l'âge elles se teintent localement de brun à partir de la marge. Certaines lames sont fourchues. Les lamelles et les lamellules sont présentes. L'arête est entière et aiguë.
- 1-6 Sporée** : blanc-crème.
- 1-7 Habitat** : dans les bois feuillus (hêtres) et de résineux. Plutôt sur sol un peu calcaire, mais pas uniquement. En été et en automne.
- 1-8 Répartition** : espèce assez peu fréquente aussi bien en plaine qu'en montagne où elle vient isolément ou en petits groupes.

## **2-OBSERVATIONS**

Outre la discrète zone vert pâle tout en haut du pied, cette russule se reconnaît par la profondeur et surtout l'étroitesse de la cavité centrale du chapeau, par la densité et l'étroitesse des lames.

## **3-INTERÊT**

Cette russule n'est pas toxique mais elle ne présente aucun intérêt.

## **4-RISQUES DE CONFUSION**

Toutes les russules compactes blanches et non noircissantes et particulièrement la *Russula delica*, encore plus fréquente.

**Vérfié le 28 mars 2013**

**MAJ MJ le 7 août 2013**