

RUSSULA SUBFOETENS

Nom de référence : *Russula subfoetens* W.G. Smith

Synonymes : *Russula foetens* var. *subfoetens* (W.G. Smith) Massée
Russula subfoetens var. *johannis* Moëgne–Loc.

Classification : **Division** : Basidiomycota
Ordre : Rusulales
Famille : Russulaceae

Nom français : russule fausse-fétide.

Intérêt culinaire : non comestible.



1-DESCRIPTION

- 1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau globuleux, convexe puis étalé et déprimé. Couleur dominante : brunâtre.
- 1-2 Chapeau** : de 5 à 10 cm. Il est nettement globuleux dans son jeune âge puis convexe ; il s'aplanit ensuite et finit par être étalé et déprimé. Le revêtement est séparable de la chair du chapeau sur 1/3 du rayon, il est lubrifié à sensiblement visqueux et brillant par temps humide mais, par temps sec, il apparaît mat et granuleux-irrégulier, fibrilleux radialement. Le revêtement est globalement jaune ochracé, brun ochracé mais, au centre, il est brun-rougeâtre alors que le pourtour est jaune ou crème. La marge mince, incurvée, est striée-sillonnée et plus pâle que le revêtement.
- 1-3 Pied ou stipe** : de 4-9 x 1-3,5 cm, il est rigide, central, cylindrique, aminci en bas, vite caverneux puis creux. Sa surface est blanchâtre, striée-veinée longitudinalement sauf au sommet qui se montre prumineux de blanc (loupe) alors qu'à la base, elle brunit avec l'âge. Le cortex est épais.
- 1-4 Chair** : épaisse au centre du chapeau, très mince au niveau de la marge, elle est ferme, cassante. La chair du chapeau est blanche et jaunit après la coupe sur les jeunes exemplaires ; la chair du pied brunit à partir de la base en se piquant de roux. L'odeur est plutôt désagréable quoique ni fétide ni repoussante ; la saveur âcre est piquante.
- 1-5 Lames** : adnées-échancrées à l'insertion sur le pied, elles sont cassantes, très serrées et souvent fourchues. Elles sont de couleur blanchâtre puis crème et se tachent de brun-rouge en vieillissant. Les lamelles et lamellules sont rares. L'arête est mince, entière puis faiblement dentelée et maculée de brun rouille dans la vieillesse.
- 1-6 Sporée** : crème.
- 1-7 Habitat** : sous feuillus (chênes, charmes, bouleaux,...), rare sous conifères, cette russule préfère les sols acides ou neutres. De la fin du printemps jusqu'à la fin de l'automne.
- 1-8 Répartition** : espèce assez peu fréquente aussi bien en plaine qu'en montagne où elle vient plutôt isolément ou en petit groupe.

2-OBSERVATIONS

La chair des russules étant granuleuse, leur pied casse comme un bâton de craie, il est donc impossible de tirer des lanières de la chair ou du cortex du pied.

3-INTERÊT

Cette russule n'est pas comestible.

4-RISQUES DE CONFUSION

Avec toutes les russules ingrates et plus particulièrement *Russula foetens*, *Russula laurocerasi*....Odeur, saveur, habitat permettent de reconnaître cette russule avec une certaine certitude.

Vérfifié le 2 octobre 2014