

## RUSSULA VIRESCENS

**Nom de référence** : *Russula virescens* (Schaeffer) Fr.

**Synonymes** : *Agaricus virescens* Schaeffer  
*Russula caseosus* Wallroth

**Classification** : **Division** : Basidiomycota  
**Ordre** : Russulales  
**Famille** : Russulaceae

**Nom français** : russule verdoyante, palomet.

**Intérêt culinaire** : bon comestible.



## 1-DESCRIPTION

**1-1 Silhouette** : au sol, de taille moyenne ou même grande, avec un pied central surmonté d'un chapeau. Couleur dominante : verdâtre pâle.

**1-2 Chapeau** : de 5 à 12 ou 13 cm. Globuleux au début, il s'étale et peut même être déprimé au centre, il est souvent bosselé. Le revêtement est séparable de la chair du chapeau sur à peine la moitié du rayon, il est sec, mat et velouté puis il se craquèle et forme une mosaïque de petites plaques plus ou moins pruineuses. Il est de couleur vert-amande, bleu-vert. Ces plaques sont plus nettes vers la marge du chapeau, elles se marquent de brun clair en vieillissant. La marge est concolore au revêtement, mince, enroulée, parfois brièvement cannelée, il arrive qu'elle se fendille par temps sec.

**1-3 Pied ou stipe** : de 3-10 x 2-5 cm. Il est cylindrique mais atténué vers le bas et élargi sous les lames. Il est cassant comme un bâton de craie, ce qui constitue un caractère des russules. Il est blanc, dur, plein mais vite vermoulu et spongieux. Sa surface est ridée, jeune elle est pruineuse en haut du pied (loupe) et se tache de brun-rouille tout en bas en vieillissant.

**1-4 Chair** : épaisse, ferme, cassante, blanche, elle est teintée de vert sous le revêtement. Elle se tache un peu de brun-rouille après la coupe. Elle est vite véreuse. La saveur de noisette est douce, l'odeur est faible, agréablement fruitée puis désagréable de fromage.

**1-5 Lames** : serrées, elles sont blanches à crème clair, très légèrement teintées de rose au fond des sinus. Elles sont étroitement adnées-ascendantes à sublibres à l'insertion sur le pied. Elles sont un peu lardacées mais restent cassantes. Les lames sont fourchues et interveinées/anastomosées à proximité du pied, elles sont aussi interveinées à proximité de la marge. Rares lamelles et lamellules. L'arête est aigüe, entière et brunissant dans la vétusté.

**1-6 Sporée** : blanche à crème pâle.

**1-7 Habitat** : dès la fin du printemps et jusqu'en automne, sous feuillus, hêtres, chênes en particulier, plus rarement sous résineux. Cette espèce pousse par temps sec, sur sol sili-  
ceux.

**1-8 Répartition** : isolé ou en groupe de quelques exemplaires.

## 2-OBSERVATIONS

Les russules se reconnaissent rapidement à leur silhouette : un pied central sans anneau ni volve, un chapeau, des lames. La texture de la chair du pied est cassante comme de la craie et aucun lait ne s'écoule à la cassure. Il existe environ 350 espèces souvent difficiles à distinguer. Certaines sont immangeables, car de saveur brûlante ou amère, quelques unes sont comestibles. Aucune n'est fortement toxique.

## 3-INTERÊT

Considérée comme une des meilleures russules.

## 4-RISQUES DE CONFUSION

Avec d'autres russules verdâtres, dont la *Russula cutefracta*.

**Vérifié le 14 février 2013**

**MAJ MJ le 7 août 2013**