

## SARCODON IMBRICATUS

**Nom de référence** : *Sarcodon imbricatus* (L.) P. Karst.

**Synonymes** : *Hydnum imbricatum* L.  
*Phaeodon imbricatus* (L.) J. Schröt.

**Classification** : **Division** : Basidiomycota

**Ordre** : Thelephorales

**Famille** : Bankeraceae

**Nom français** : sarcodon imbriqué, hydne imbriqué, barbe de bouc, hydne hérissé.

**Intérêt culinaire** : comestible jeune.



Photo : Claude Tinlot

## **1-DESCRIPTION**

**1-1 Silhouette** : au sol, de dimension moyenne à grande. Il possède un pied surmonté d'un chapeau écailleux. Couleur dominante : brun terne.

**1-2 Chapeau ou réceptacle** : de 5 à 20 cm. Souvent un peu lobé, il est d'abord convexe, puis aplati et légèrement déprimé au centre. Le revêtement est de couleur gris-brun à brun-roux, brun-noir, couvert de grosses écailles espacées plus foncées et retroussées, elles sont épaisses au centre, plus minces, moins relevées vers la marge et séparées par des crevasses pâles. La marge est plus claire, jusqu'à blanchâtre mais elle passe au brun avec l'âge, elle est incurvée ou bien enroulée.

**1-3 Pied ou stipe** : de 4-9 x 1,5-5 cm. Il est souvent court et massif, central ou un peu excentré, en massue en bas et évasé en haut, sa surface est veloutée, feutrée et d'aspect mat. Le pied est plus clair que le chapeau, d'abord gris-blanchâtre puis gris-noirâtre à beige-brunâtre. La base est plus claire, jusqu'à blanchâtre.

**1-4 Chair** : elle est plutôt ferme, cassante, assez épaisse. Dans les endroits meurtris la chair est blanchâtre à brunâtre pâle puis brunâtre et on n'y note pas de traces de couleur jaune, bleu-vert ou bien violacée. La saveur est peu agréable et même amère chez les vieux exemplaires, l'odeur est celle de la chicorée.

**1-5 Aiguillons** : les aiguillons sont courts de 2 à 10 mm, assez serrés, un peu décurrents, beige pâle, puis gris-blanchâtre et finalement brun purpuracé à gris foncé.

**1-6 Sporée** : brune.

**1-7 Habitat** : isolé ou en groupe dans les bois de résineux, sous épicéas et pins, en automne.

**1-8 Répartition** : fréquent dans les régions montagneuses et au sud de la France, il est rare ou même absent en plaine.

## **2-OBSERVATIONS**

Le sarcodon imbriqué pousse en été et en automne, de préférence sous les conifères en montagne. Le plus souvent le sarcodon imbriqué forme de grands cercles ou des lignes, ce qui permet de choisir les plus jeunes.

## **3-INTERÊT**

Certains consommateurs utilisent le sarcodon imbriqué comme épice pour aromatiser les plats (boulettes de viande hachée par exemple...). D'autres, après l'avoir ébouillanté deux fois, l'utilisent séché et râpé pour aromatiser les potages.

## **4-RISQUES DE CONFUSION**

Confusion possible avec l'hydne rugueux ou sarcodon écailleux (*Sarcodon scabrosus*), qui vient en plaine sous les feuillus et dont le bas du pied est nettement teinté de bleu. Cette dernière espèce est rare.

**Vérfié le 13 mars 2012**

**MAJ MJ le 7 août 2013**