

STROBILURUS STEPHANOCYSTIS

Nom de référence : *Strobilurus stephanocystis* (Kühner & Romagnesi ex Hora) Singer

Synonymes : *Pseudobiatula stephanocystis* (Kühner & Romagnesi) ex Hora

Collybia stephanocystis Kühner & Romagnesi

Classification : **Division** : Basidiomycota

Ordre : Agaricales

Famille : Physalacriaceae

Nom français : collybie des cônes de pins, collybie à cystides coiffonnées.

Intérêt culinaire : a2c2n.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : sur cônes, de faible dimension, avec un pied surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : brun.

1-2 Chapeau : de 0,5 à 3 cm, il est d'abord hémisphérique puis convexe et généralement obtusément mamelonné. Son revêtement est lisse, non strié ou à peine marqué de petites rides (loupe) ; mat, il est brun ocre à brun-rougeâtre mais il peut avoir une couleur beige ochracé, le centre étant toujours sensiblement plus foncé. La marge est fine, lisse, non striée et un peu débordante.

1-3 Pied ou stipe : 2-6 x 0,1-0,2 cm, il est cylindrique, souvent sinueux, élastique et se termine par une longue pseudo-racine. Sa surface, mate, lisse, un peu pruinée (loupe), fibrilleuse est blanchâtre au sommet, ocre clair à ocre foncé en-dessous.

1-4 Chair : mince, blanchâtre dans le chapeau, elle est ochracée dans le pied. Son odeur est faible et sa saveur est douce.

1-5 Lames : à peine échanquées, ascendantes à presque libres à l'insertion sur le pied, elles sont moyennement serrées, étroites, et de couleur blanche à blanc-grisâtre. Présence de lamelles et de lamellules. L'arête est fine et entière.

1-6 Sporée : blanche.

1-7 Habitat : sur cônes de pins plus ou moins enfouis, essentiellement de pins sylvestres, cette espèce se rencontre surtout en altitude mais pas uniquement. Il s'agit d'un champignon printanier.

1-8 Répartition : en plaine mais surtout en montagne.

2-OBSERVATIONS

3-INTERÊT

Aucun.

4-RISQUES DE CONFUSION

Avec les autres champignons poussant sur cônes dont *Baeospora myosura*, *Strobilurus esculentus*, *Strobilurus tenacellus*, *Baeospora myosura*, *Mycena seynii*.

TABLEAU DE COMPARAISON DES CHAMPIGNONS A LAMES POUSSANT SUR DIVERS CÔNES

	<i>Baeospora myosura</i>	<i>Strobilurus esculentus</i>	<i>Strobilurus stephanocystis</i>	<i>Strobilurus tenacellus</i>	<i>Mycena seynii</i>
Sur cônes de	Pins surtout, épicéas...	Epicéas	Pins	Pins	Pins
Saison	Automne	Printemps	Printemps	Printemps	Été, automne, hiver
Lames	Très serrées	Assez serrées	Assez serrées	Assez serrées	Peu serrées
Couleur des lames	Blanc-grisâtre	Blanc-grisâtre	Blanc-grisâtre	Blanc-grisâtre	Rose pâle
Arêtes des lames	Concolore aux faces	Concolore aux faces	Concolore aux faces	Concolore aux faces	Pourpre
Saveur	Douce	Douce	Douce	Amarescente	Douce
Répartition	Plaine et montagne	Plaine et montagne	Surtout montagne	Plaine et montagne	Plaine, littoral

Vérfié en séance le 27 février 2014