

TARZETTA CATINUS

Nom de référence : *Tarzetta catinus* (Holmskj.) Kort

Synonymes : *Peziza catinus* Holmskj.
Pustularia catinus (Holmskj.)Fuckel

Classification : **Division** : Ascomycota
Ordre : Pezizales
Famille : Pyrenomataceae

Intérêt culinaire : sans intérêt.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : sur terre nue, de faible dimension. En forme de coupe sur un pied plus ou moins long. Couleur dominante : crème à noisette.

1-2 Chapeau, sporophore, carpophore, ... : la fructification porte le nom d'apothécie, elle a la forme d'une coupe. Son diamètre varie de 1 à 4 cm. La face supérieure (dite aussi interne) est lisse et de couleur crème à noisette. La marge est dentelée ou lobée, de couleur plus pâle. Le fond de la coupe est souvent percé dans la vieillesse. La face inférieure (dite aussi externe) est duveteuse et feutrée, elle est concolore à la face supérieure ou un peu plus pâle.

1-3 Pied ou stipe : très fin, plus ou moins long, il est enfoncé dans la terre.

1-4 Chair : mince et cassante, elle ne présente ni odeur, ni saveur particulières.

1-5 Lames, tubes et pores, aiguillons : ce champignon n'en possède pas.

1-6 Sporée : blanche.

1-7 Habitat : espèce parfois isolée, mais le plus souvent en groupe de plusieurs individus qui peuvent se comprimer. Dans les forêts de feuillus ou de conifères, sur la terre nue des chemins. De mai à septembre.

1-8 Répartition : présence très répandue en plaine et en montagne. Elle passe souvent inaperçue.

3-INTERÊT

Ce champignon comme ses proches ne présente aucun intérêt culinaire.

4-RISQUES DE CONFUSION : |

L'espèce *Tarzetta cupularis* est très proche et difficile à distinguer de *Tarzetta catinus* ; seuls des examens au microscope permettent réellement d'identifier avec certitude ces deux espèces.

Vérifié le 23 mars 2014