

TRICHOLOMA EQUESTRE

Nom de référence : *Tricholoma equestre* (L.) Kummer

Synonymes : *Tricholoma flavovirens* S. Lundell

Tricholoma auratum Gillet

Classification : **Division :** Basidiomycota

Ordre : Agaricales

Famille : Tricholomataceae

Nom français : tricholome équestre.

Intérêt culinaire : à considérer comme mortel.



1-DESCRIPTION

1-1 Silhouette : au sol, de dimension moyenne avec un pied central surmonté d'un chapeau convexe. Couleur dominante : jaune.

1-2 Chapeau : de 4 à 12cm. Conique au début puis convexe et enfin étalé, il conserve un mamelon central obtus. Le revêtement est jaune à jaune-olivâtre. Au centre, il est brun-olivâtre en raison de fines mèches ou squamules brunes qui le recouvrent assez densément (loupe). Il est légèrement visqueux par temps humide. La marge est fine et enroulée vers l'intérieur.

1-3 Pied ou stipe : de 3-10 x 0,3-3 cm, il est central, épais, cylindrique ou un peu fusoïde, sa surface est jaune, lisse avec quelques méchules fibrilleuses apprimées et concolores à celles du chapeau. Il n'est pas profondément enterré comme l'est *Tricholoma auratum*.

1-4 Chair : ce champignon est assez peu charnu. La chair n'est épaisse qu'au centre du chapeau, elle est ferme, jaune pâle dans le chapeau et dans le pied, elle n'est jamais franchement blanche, elle est immuable. L'odeur est faiblement farineuse, la saveur est douce.

1-5 Lames : assez serrées, larges et échancrées à l'insertion sur le pied. Elles sont de couleur jaune vif, fourchues à proximité de la marge du chapeau. Lamelles et lamellules présentes. L'arête peut se montrer denticulée et de couleur plus sombre que les faces.

1-6 Sporée : blanche.

1-7 Habitat : dans les bois sableux de résineux essentiellement, mais parfois de feuillus, il pousse en été et en automne.

1-8 Répartition : ce champignon est assez commun.

2-OBSERVATIONS

Ce champignon est souvent confondu avec le *Tricholoma auratum*, certains ouvrages ne font pas la distinction entre ces deux espèces.

3-INTERÊT

Le tricholome équestre a longtemps été considéré comme excellent comestible. Il ne faut pas le consommer par risque de confusion avec le Tricholome doré (*Tricholoma auratum*). En France, la commercialisation de ces deux tricholomes est maintenant interdite.

4-RISQUES DE CONFUSION

Essentiellement avec le *Tricholoma auratum* plus charnu, au pied profondément enterré et dont la chair est blanche (sauf sous le revêtement du chapeau et le cortex du pied où elle est marquée de jaune), le *Tricholoma sejunctum* a les lames blanc-crème, le *Tricholoma sulphureum* à odeur fort désagréable. Ces trois espèces sont à rejeter.

Vérfifié le 10 janvier 2013

MAJ MJ septembre 2013